PCS 2215
Fundamentos de Engenharia de Computação II

Aulas 4-5
Grafos

Líria Sato
Professor Responsável

versão: 1.2 (agosto 2002)

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002 Aulas 4-5 PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II 1

Conteúdo

4. Representação de grafos, Grafos isomorfos e planares

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002 Aulas 4-5 PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II 2

4.1 Representação de Grafos

Algumas vezes, por exemplo, quando se deseja fazer uma implementação no computador para uma análise do grafo, precisamos de uma representação mais formal. Uma forma de representação é através da **matriz de adjacência**. Outra forma é a **matriz de incidência**.

4.1.1 Matriz de adjacência

- atribuímos rótulos às linhas e colunas com os vértices ordenados
- se os vértices da linha e coluna são adjacentes então o valor é 1, caso contrário é 0.

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002 Aulas 4-5 PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II 3

4.1 Representação de Grafos

Exemplo

	a	b	c	d	e
a	0	1	0	1	0
b	1	0	1	0	1
c	0	1	0	1	1
d	1	0	1	0	0
e	0	1	1	0	0

Fig. 1.10: grafo correspondente à matriz de adjacência do exemplo

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002 Aulas 4-5 PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II 4

4.1 Representação de Grafos

Se A é a matriz de adjacência de um grafo simples, a potência de A ,

$$A, A^2, A^3, \dots, A^n$$

fornece o número de caminhos de vários comprimentos.

Por exemplo: A^2 conta o número de caminhos com comprimento 2.

4.1. Representação de Grafos

	a	b	c	d	e		a	b	c	d	e		a	b	c	d	e			
a	0	1	0	1	0	=	2	0	2	0	1	=	2	0	2	0	1			
b	1	0	1	0	1		0	3	1	2	1		0	3	1	2	1	1		
c	0	1	0	1	1		0	1	0	1	1		2	1	3	0	1	0	1	
d	1	0	1	0	0		1	0	1	0	0		2	0	2	0	2	1	0	2
e	0	1	1	0	0		0	1	1	0	0		1	1	1	1	1	2	0	1

Número de caminhos de a para c com compr. 2 é 2
(linha a, coluna c da matriz resultante)
realmente: (a,b,c) e (a,d,c)

4.1 Representação de Grafos

Entrada na linha x e coluna y de A^2 : é o número de caminhos com comprimento 2

Entradas na diagonal de A^2 : é o grau dos vértices
grau do vértice c: 3 (realmente há 3 arestas incidentes em c)

Teorema 6.5.3

Se A é a matriz de adjacência de um grafo simples, a ij -ésima entrada de A^n é igual ao número de caminhos de comprimento n do vértice i para o vértice j , $n=1,2,\dots$

4.1 Representação de Grafos

4.1.2 Matriz de incidência

Rotulamos as linhas com os vértices e as colunas com as arestas (em alguma ordem arbitrária).

A entrada para a linha v e coluna e é:

1: se e é incidente sobre v

0: caso contrário

4.2. Grafos Isomorfos

Instruções são dadas a duas pessoas, que não estão se vendo, para que desenhem e nomeiem 5 vértices a, b, c, d, e . Conectem $a e b, b e c, c e d, d e e$.

São produzidos os grafos da figura 4.1. Estas figuras definem o mesmo grafo, embora possam parecer que sejam dissimilares. Tais grafos são ditos **isomorfos**.

4.2. Grafos Isomorfos

Definição (6.6.1)

Grafos G_1 e G_2 são **isomorfos** se existe uma função bijetora f dos vértices de G_1 para os vértices de G_2 e uma função bijetora g das arestas de G_1 para as arestas de G_2 , de modo que uma aresta e é incidente sobre v e w em G_1 se e somente se a aresta $g(e)$ é incidente sobre $f(v)$ e $f(w)$ em G_2 . O par de funções é chamado um isomorfismo de G_1 para G_2 .

4.2. Grafos Isomorfos

Um isomorfismo para os grafos G_1 e G_2 da figura 4.1 é definido por:

$$f(a)=A, f(b)=B, f(c)=C, f(d)=D, f(e)=E$$

$$g(x_i)=y_i, i=1, \dots, 5$$

Se nós definimos uma relação R sobre um conjunto de grafos pela regra $G_1 R G_2$ se G_1 e G_2 são isomorfos, R é uma relação de equivalência. Cada classe de equivalência consiste de um conjunto de grafos mutuamente isomorfos.

4.2. Grafos Isomorfos

Teorema 6.6.4

Seja G_1 e G_2 grafos simples. As afirmações seguintes são equivalentes.

- G_1 e G_2 são isomorfos.
- Existe uma função bijetora do conjunto de vértices de G_1 para o conjunto de G_2 satisfazendo: vértices v e w são adjacentes em G_1 se e somente se os vértices $f(v)$ e $f(w)$ são adjacentes em G_2 .

4.2. Grafos Isomorfos

Teorema 6.6.5

Grafos simples G_1 e G_2 são isomorfos se e somente se para alguma ordenação de seus vértices, suas matrizes de adjacência são iguais.

Matriz de adjacência de G_1 Matriz de adjacência de G_2

	a	b	c	d	e		A	B	C	D	E
a	0	1	0	0	1	=	0	1	0	0	1
b	1	0	1	0	0		1	0	1	0	0
c	0	1	0	1	0		0	1	0	1	0
d	0	0	1	0	1		0	0	1	0	1
e	1	0	0	1	0		1	0	0	1	0

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002

Aulas 4-5

PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II

13

4.2. Grafos Isomorfos

Como determinar se dois grafos são isomorfos?

Algoritmos conhecidos: requerem tempo exponencial ou fatorial, no pior caso.

Existe um algoritmo que requer tempo linear, no caso médio.

Como mostrar que dois grafos simples G_1 e G_2 não são isomorfos:

encontrar uma propriedade de G_1 que G_2 não tem, mas que G_2 deveria ter se G_1 e G_2 fossem isomorfos. Tal propriedade é chamada de invariante.

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002

Aulas 4-5

PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II

14

4.2. Grafos Isomorfos

Se os grafos G_1 e G_2 são isomorfos então, G_1 e G_2 têm o mesmo número de arestas e o mesmo número de vértices. Portanto, se e e n são inteiros não negativos, as propriedades *tem e arestas* e *tem n vértices* são invariantes.

Fig. 4.2: grafos não isomorfos

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002

Aulas 4-5

PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II

15

4.2. Grafos Isomorfos

Note que com a verificação de invariantes, como a utilizada no exemplo, podemos dizer que um par de grafos **não são isomorfos**.

Seria fácil testar se um par de grafos são isomorfos, se pudéssemos encontrar um número pequeno de invariantes que fossem facilmente verificadas, as quais grafos isomorfos e somente eles compartilham. Infelizmente, ninguém teve sucesso em encontrar tal conjunto de invariantes.

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002

Aulas 4-5

PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II

16

4.3 Grafos Planares

Três cidades C1, C2 e C3 estão diretamente conectadas por vias expressas para cada três outras cidades C4, C5 e C6. Este sistema rodoviário pode ser projetado tal que as vias não se cruzem?

Grafo $K_{3,3}$

Fig. 4.3: cidades conectadas por vias expressas

4.3 Grafos Planares

Um grafo é **planar** se ele pode ser desenhado no plano sem que haja cruzamento de arestas.

Se um grafo conectado planar é desenhado no plano, o plano é dividido em regiões contíguas chamadas **faces**. Uma face é caracterizada pelo ciclo que forma seu limite.

Por exemplo:

face A: é limitada por (5,2,3,4,5)

face D: é limitada por (1,2,3,4,6,1)

Fig. 4.4: Grafo conectado planar

4.3 Grafos Planares

Fórmula de Euler para grafos

Se G é um grafo conectado planar, com e arestas, v vértices e f faces então,

$$f = e - v + 2$$

No grafo da figura 4.4, tem-se:

$f=4$, $e=9$, $v=6$. Nota-se que satisfaz a equação.

Esta equação pode ser usada para mostrar que certos grafos não são planares.

4.3 Grafos Planares

Consideremos o grafo $K_{3,3}$ da figura 4.3.

Suponhamos que o grafo $K_{3,3}$ é planar. Desde que cada ciclo tem no mínimo 4 arestas, cada face é delimitada por no mínimo 4 arestas. Portanto o número de arestas que delimitam faces é no mínimo $4f$.

Em um grafo planar, cada aresta pertence no máximo a dois ciclos. Portanto,

$$2e \geq 4f$$

Aplicando a fórmula de Euler para grafos,

$$2e \geq 4(e - v + 2)$$

$$e = 9, v = 6$$

$$18 = 2 \times 9 \geq 4(9 - 6 + 2) = 20$$

Que é uma contradição. Portanto $K_{3,3}$ não é planar.

4.3 Grafos Planares

O grafo K_5 , apresentado na figura 4.5 não é um grafo planar.

Podemos provar, usando os mesmos argumentos utilizados para provar que $K_{3,3}$ não é planar.

Obviamente, se um grafo contém $K_{3,3}$ ou K_5 como um subgrafo, não pode ser planar.

Fig. 4.6: grafo não planar K_5

4.3 Grafos Planares

Para apresentarmos o teorema de Kuratowski, que mostra que um grafo é planar, precisamos apresentar o conceito de grafos homeomorfos, e antes precisamos apresentar o que são subgrafos.

Um subgrafo G' de um grafo G é obtido, selecionando algumas arestas e vértices, sujeito à restrição que se nós selecionamos uma aresta e em G , que é incidente sobre os vértices v e w , devemos incluir v e w em G' . A restrição é para garantir que G' é realmente um grafo.

4.3 Grafos Planares

Definição 6.2.8

Seja um grafo $G=(V,E)$. Chamamos (V',E') um subgrafo de G se:

- a) $V' \subseteq V$ e $E' \subseteq E$
- b) Para cada aresta $e' \in E'$, se e' é incidente sobre v' e w' , então $v', w' \in V'$.

Fig. 4.7: grafo G e os subgrafos de G

4.3 Grafos Planares

Definição 6.7.3

Se um grafo G tem um vértice v de grau 2 e arestas (v, v_1) e (v, v_2) , com $v_1 \neq v_2$, dizemos que as arestas (v, v_1) e (v, v_2) estão em série. Uma redução de série consiste em retirar o vértice v do grafo G e substituir as arestas (v, v_1) e (v, v_2) pela aresta (v_1, v_2) . O grafo resultante G' é dito ser obtido de G por uma redução de série.

4.3 Grafos Planares

Exemplo:

No grafo da figura 4.8, as arestas (v, v_1) e (v, v_2) estão em série. O grafo G' é obtido de G por uma redução de série.

Fig. 4.8: G' é obtido de G por uma redução de série

4.3 Grafos Planares

Definição 6.7.5

Grafos G_1 e G_2 são homeomorfos se G_1 e G_2 podem ser reduzidos para grafos isomorfos, realizando reduções de série.

Teorema de Kuratowsky

Um grafo G é planar se e somente se G não contém um subgrafo homeomorfo a K_5 ou $K_{3,3}$.

4.3 Grafos Planares

Mostre que o grafo da figura 4.8 não é planar usando o teorema de Kuratowski.

Fig. 4.9: exemplo

4.3 Grafos Planares

Primeiro podemos notar que os vértices a, b, f e e , têm grau 4. No $K_{3,3}$, cada vértice tem grau 3. Vamos então eliminar as arestas (a,b) e (f,e) . Assim todos os vértices passam a ter grau 3.

Segundo, o $K_{3,3}$ tem 9 arestas e 6 vértices, e o grafo da figura 4.9 tem 12 arestas e 8 vértices. Se eliminarmos uma aresta incidente em um vértice (v) com $\delta(v)=3$, tem-se, $\delta(v)=2$, podendo-se aplicar redução de série, pois queremos ter 9 arestas e 6 vértices.

Usando tentativa e erro, vemos que se eliminarmos a aresta (g,h) e aplicando a redução de série, obteremos uma cópia isomorfa do $K_{3,3}$. Portanto, o grafo da figura 4.8 não é planar, desde que contém um subgrafo homeomorfo a $K_{3,3}$.

4.3 Grafos Planares

Elimina arestas
(a,b) e (f,e)

Fig. 4.10: eliminando arestas para obter um subgrafo

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002 Aulas 4-5 PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II 29

4.3 Grafos Planares

Elimina aresta (g,h)

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002 Aulas 4-5 PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II 30

4.3 Grafos Planares

Reduções de série
Elimina g e h

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002 Aulas 4-5 PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II 31

Bibliografia

[1] Johnsonbaugh, R. Discrete Mathematics. Prentice Hall International, London, UK, 4th. Ed. 1997. Cap. 6.

© Gomi, Reali, Sato e Sichman, 2002 Aulas 4-5 PCS 2215 - Fund. Eng. Comp. II 32